

Chrysopa dorsalis Burmeister, 1839



Adulto originale

E' infeudata esclusivamente su piante del genere *Pinus* fra le cui specie *P. silvestris* è il più frequentemente citato in letteratura (Aspöck et al., 1980). In Italia sono presumibilmente presenti due generazioni per anno (Pantaleoni, 1988).

Stadi preimmaginali:

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 11 a 15 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e settembre; stadio di svernamento: prepupa. (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia-Giulia; Liguria ?; Emilia Romagna; Toscana (anche Isola di Montecristo); Lazio; Abruzzo; Molise; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Costa, 1884a(?),b(?),c(?), 1885b(?); Tacchetti, 1861; Grandi, 1955, 1958; Castellani, 1957; Fanfani et al., 1979; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980; Nicoli Aldini, 1983; Pantaleoni, 1982, 1984, 1986b, 1988, 1990a,c; Insom et al., 1985; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995 /(?); Letardi & Pantaleoni, 1996; Letardi, 1997(?), 2022; Pantaleoni & Letardi, 1998; Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Longo et al., 2001; Molinu et al., 2007; Letardi & Nicoli Aldini, 2007; Cesaroni, 2007; Monserrat, 2008; Selis, 2010b; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).