

Conwentzia pineticola (Enderlein, 1905)



Adulto da Wachmann e Saure, 1997

C. pineticola è simile a *C. psociformis* ma si trova solo su conifere, sebbene si trovi saltuariamente anche in frutteti, dove preda acari. Specie esclusiva del genere *Pinus* che colonizza dal livello del mare al livello superiore dei boschi (Eglin, 1940; Kis *et al.*, 1970; Ressler, 1971b; Meinander, 1972; Aspöck *et al.*, 1980). Nella Pianura Padana sud-orientale è stata sempre rinvenuta in pochi esemplari, sia al livello del mare (Pantaleoni, 1982) che in quota. E' presente su esemplari di *Pinus nigra*. In bibliografia la specie è citata come bi- o trivoltina (Aspöck *et al.*, 1980), con adulti tra la fine di aprile sino settembre. In Romagna è stata raccolta fra la metà di giugno e l'inizio d'agosto.

Stadi preimmaginali: Collyer, 1951.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2.7 a 3.7 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e ottobre; stadio di svernamento: prepupa (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Emilia Romagna; Toscana; Basilicata; Puglia; Sicilia; Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Domenichini, 1965; Aspöck *et al.*, 1980; Monserrat, 1980; Pantaleoni, 1982, 1986b, 1988, 1989b, 1990a; Divietri, 1993; Nicoli Aldini, 1994; Monserrat, 1994a; Hellrigl *et al.*, 1996(?); Nicoli Aldini & Baviera, 2001; Cesaroni, 2007; Sforzi *et al.*, 2019a;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).