

Pseudomallada ibericus (Navás, 1903)



adulto foto Badano

Specie mediterraneo occidentale legata probabilmente ad una vegetazione di macchia, in Sardegna caratteristica delle formazioni a ginepro vegetanti sulle dune o comunque lungo le coste (Cesaroni, 2007) ma le sue esigenze ecologiche devono ancora essere chiarite; raccolta dal livello del mare sino ai 1200 m. (Aspöck et al, 1980). Probabilmente bi- o trivoltina, è presente in natura allo stato adulto da maggio a settembre. Sverna allo stadio larvale.

Stadi preimmaginali: non ancora descritti. **Parassitoidi degli adulti:** *Chrysopophthorus* sp. (Hymenoptera).

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 10 a 13 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Liguria; Toscana (limitatamente all'isola di Capraia); Sardegna (compresa l'isola di Asinara).

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Grandi, 1957; Principi, 1962; Hölzel, 1965a; Hölzel & Ohm, 1972; Aspöck et al., 1980; Bernardi Iori et al., 1995; Pantaleoni & Letardi, 1998; Canard et al., 2006; Molinu et al., 2007; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Insom & Terzani, 2012;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).