

Dichochrysa ventralis (Curtis, 1834)



adulto da Wachmann e Saure, 1997

Specie relativamente euriecia frequentante sia Conifere che latifoglie degli strati arboreo ed arbustivo in biotopi umidi, chiusi, ricchi di vegetazione, freschi (Aspöck et al., 1980). Voltinismo e fenologia sono poco conosciuti, probabilmente mostra 1-2 generazioni annue. Gli adulti sono presenti da maggio a settembre (Pantaleoni, 1988).

Stadi preimmaginali: Withycombe, 1923.

Ampiezza dell'ala anteriore delle imagini: da 12 a 16 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e settembre; stadio di svernamento: larva; parassiti delle larve: *Perilampus* spp. (Perilampidae), *Helorus* spp. (Pschorn-Walcher, 1971) (Heloridae); parassiti degli adulti: *Chrysopophthorus* spp. (Braconidae) (Aspöck et al, 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia-Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Marche; Abruzzo; Basilicata; Puglia; Calabria.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

McLachlan, 1896; Golfari, 1946; Principi, 1948, 1956a, 1958; Grandi, 1955, 1958; Castellani, 1957; Aspöck, 1963b; Eglin-Dederding, 1967; Schmid, 1972; Aspöck et al., 1980; Pantaleoni, 1988, 1990a,c; Insom et al., 1985; Pantaleoni et al., 1984; Minelli et al., 1993; Nicoli Aldini, 1994; Letardi & Pantaleoni, 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Canard et al., 2006; Monserrat, 2008; Letardi, 2009c, 2022; Badano & Letardi, 2010; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).