

Dichochrysa venusta (Hölzel, 1974)



Adulto da Barraco, 2008b

Specie le cui esigenze ecologiche devono ancora essere chiarite; nell'isola di Creta raccolta in area di conifere; raccolta alla quota di 1000 m. (Aspöck et al., 1980). È presente in natura allo stato adulto da giugno a luglio.

Stadi preimmaginali: sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 10 a 13 mm. (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Liguria; Toscana (isola di Montecristo); Umbria; Campania?; Calabria; Sicilia (e Pantelleria); Sardegna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Hölzel, 1974; Fanfani et al., 1979; Aspöck et al., 1980; Pantaleoni et al., 1984, 1985a, 1995; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi, 1998b(?); Badano, 2006b; Tillier, 2008; Letardi et al., 2008; Monserrat, 2008; Barraco, 2008b, 2009l,o; Badano & Letardi, 2010; Lenzini, 2011h;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).