

***Dilar parthenopaeus* Costa, 1855**



Maschio adulto (Foto Lentini)



Femmina adulta (Foto Pantaloni)

Specie dalle caratteristiche ecologiche pressoché sconosciute. Raccolta in Italia in querceti misti di bassa quota, in lecceta e sul limite superiore della vegetazione, tra i 300 e i 1700 m. nel periodo fine giugno - metà agosto (Letardi, 1994b,c; Loru et al., 2011; Pace, comm. pers.).

**Endemismo italiano**

**Locus typicus italiano: Monti della Cava [prob. Cava de' Tirreni], Campania**

**Stadi preimmaginali:** sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 4,5 a 6,5 mm. i ♂ (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980); 4 mm. le ♀ (ali modificate, inabili al volo, ali posteriori vestigiali di 0,5 mm. ca.; Pantaloni e Letardi, 1996).

**Distribuzione regionale italiana:**

Lazio; Campania; Basilicata; Calabria; Sicilia?; Sardegna.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Costa, 1855; Brauer, 1876; Costa A., 1884b; Hagen, 1860a; Hagen, 1866; Navás, 1909; Navás, 1910; Navás, 1914; Grandi, 1951; Aspöck et al., 1980; Letardi, 1994b, 1994c, 2015; Bernardi Iori et al., 1995; Pantaleoni & Letardi, 1996; Aspöck U. & H., 1999; Monserrat, 2005; Aspöck U. & H., 2007; Cesaroni, 2007; Risoldi, 2009b; Loru et al., 2011; Pace, 2013;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).