

Hemerobius contumax Tjeder, 1932



Adulto foto Derremaux

Specie legata alla presenza di Conifere (*Picea*, *Larix*, *Pinus*) dal livello del mare al piano subalpino (Aspöck et al., 1980).

Stadi preimmaginali: sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6.5 a 9 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e settembre (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta?; Lombardia; Trentino Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Basilicata; Puglia; Calabria.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Principi, 1966; Zangheri, 1966; Aspöck et al., 1969, 1980; Pantaleoni, 1988, 1990d, 1990a, 1990c; Pantaleoni et al., 1994; Nicoli Aldini, 1994, 2021; Hellrigl et al., 1996; Badano, 2008c; Letardi, 2009c, 2022; Badano & Letardi, 2010; Letardi et al., 2010; Letardi & Scalercio, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).