

Hemerobius pini Stephens, 1836



Adulto da Wachmann e Saure, 1997



larva da Aspöck U. & H., 1999

Specie esclusiva delle Conifere con una certa preferenza, nonostante il nome, per gli Abeti (Aspöck et al., 1980). In particolare, in impianti monocolturali di *Picea* sp. svolge un ruolo importante

come predatore di afidi come gli Adelgidae (Stelzl & Devetak, 1999). Due generazioni annuali, con periodo di volo tra fine Aprile e fine Settembre, con massimo tra giugno e Agosto.

Stadi preimmaginali: Killington, 1937.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 6 a 9 mm.; gli adulti si trovano in natura tra aprile/maggio e settembre/ottobre; parassiti delle larve: *Anacharis* spp. (Aspöck H., Aspöck U., Hölzel U., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte ?; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Minelli, 1977; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 1991; Pantaleoni, 1988, 1990c; Nicoli Aldini, 1994; Hellrigl et al., 1996; Letardi, 2022;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).