

Micromus paganus Linnaeus, 1767



Adulto foto Key On Web

Specie piuttosto euriecia ed euritopa, la si trova prevalentemente negli strati erbacei ed arbustivo in zone di latifoglie, ma anche in giardini e parchi suburbani, dal livello del mare sino al piano montano e, in alcuni casi, a quello subalpino (Aspöck et al., 1980; Plant, 1994).

Stadi preimmaginali: Killington, 1936.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 8.5 a 11 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e ottobre (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Lazio; Abruzzo; Puglia; Calabria; Sicilia.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

A.Costa, 1869; Della Torre, 1882; Heller & Della Torre, 1882; Navás, 1913b, 1929, 1933; Principi, 1966; Eglin-Dederding, 1967; Aspöck et al., 1980; Monserrat, 1980, 1991; Pantaleoni, 1990c; Cocquemot et al., 1990; Nicoli Aldini, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Letardi & Migliaccio, 2000; Letardi et al., 2010; A.A.V.V. 2018b(?); Letardi & Scalercio, 2018; Letardi, 2022;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).