

***Myrmeleon gerlindae* Hölzel, 1974**



Adulto foto Badano



Larva Badano & Pantaleoni, 2014



Imbuto larvale

Specie con larva costruttrice di imbuto, nel terriccio di zone boscate a quote varie tra i 100 e i 1500 m. (Aspöck et al., 1980). Questo formicaleone poco conosciuto è apparentemente un vicariante ecologico del congenere e strettamente correlato *M. formicarius*, sostituendo quest'ultimo in biotopi xerici. *M. gerlindae* è associato a boschi aridi e boscaglie. Le larve costruiscono i loro imbuto trappola in siti protetti come alla base degli alberi, sotto i cespugli o sporgenze rocciose (Badano & Pantaleoni, 2014).

Stadi preimmaginali: Nicoli Aldini et al., 2008.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 25 a 28 mm.; gli adulti si trovano in natura tra luglio e agosto (settembre) (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana: Liguria; Toscana (limitatamente all'isola di Montecristo); Sardegna (compresa isola di Asinara).

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia: Pantaleoni, 1994a; Bernardi Iori et al., 1995; Tröger, 1999; Angioi, 2006; Molinu et al., 2007; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010; Badano & Pantaleoni, 2014; AAVV, 2015b; Letardi & Badano, 2018;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).