

Nemoleon notatus (Rambur, 1842)



Maschio <http://darwin.bio.ucm.es/bioimagen/index.php?d=muestrafoto.php&foto=617&au=4&back=/bioimagen/index.php?au=4&criterio=autor#>



Larva da Badano & Pantaleoni, 2014.

Specie poco conosciuta, *N. notatus* è associata con ambienti aridi aperti come la savana, mentre in Europa questo formicaleone, raramente raccolto, viene segnalato prevalentemente in siti costieri aridi. In Sardegna, questa specie vive in boscaglie aride e rocciose. L'unica larva nota è stata trovata sepolta sotto una sporgenza di roccia (Badano & Pantaleoni, 2014).

Stadi preimmaginali: Badano & Pantaleoni, 2014.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 26 a 33 mm.; gli adulti si trovano in natura (in Europa) tra giugno e luglio (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana: Sardegna.

Publicazioni che citano questa specie in Italia: Pantaleoni, 1994a; Bernardi Iori et al., 1995; Cesaroni, 2007; Sechi, 2012; Badano & Pantaleoni, 2014; Badano et al., 2017;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).