

***Raphidia ophiopsis* Linnaeus, 1758**



Femmina, dal [web](#)



Maschio dal [web](#)

Specie a larve presumibilmente subcorticole, legate ad ambienti di conifere (Aspöck et al., 1991).

Specie semivoltina (Aspöck et al., 1991).

Stadi preimmaginali: Aspöck et al., 1991. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: M da 8,0 a 9,5 mm., F da 8,2 a 11,2 mm.; gli adulti si trovano in natura tra (aprile) maggio e luglio (agosto) (Aspöck et al., 1991). **Stadio di svernamento:** larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis* sp. **Parassiti:** *Gregarina raphidiae*

Distribuzione regionale italiana: Trentino Alto-Adige; Friuli Venezia Giulia?

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Aspöck, Aspöck et al., 1976 (?); Ambrosi, 1851 (?); Aspöck et al., 1980 (?); Thaler, 1989; Aspöck et al., 1991; Hellrigl et al., 1996;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).