

dell'ala, e le laminette finamente ciliate in tutta la lunghezza. Il dorso delle stesse è fulvo-pallido. Sotto quest'ultimo rapporto la *Disparella* si pone a fianco della *Pectinatella*, ma i suoi palpi sono più corti.» (Laharpe op. cit.)

(continua).

MATERIALI PER UNA FAUNA ENTOMOLOGICA

DELL' ISOLA D' USTICA

Seconda contribuzione

DEL DOTT. G. RIGGIO

(Cont. e fine. V. N. 1).

LEPIDOTTERI

1. *Vanessa atalanta*, Lin.—Frequente soprattutto alla Falconiera, dove ne raccolsi ed osservai parecchi individui.
2. *Pararge megera*, Lin.—Frequente dovunque.
3. *Acherontia atropos* Lin.—Di questa grossa e caratteristica Sfinge catturai alquanti individui in contrada Tramontana e nello stesso paese; prosì pure frequentemente le larve.
4. *Euprepia pudica*, Esp.—Trovi questa specie con una certa frequenza specialmente in contrada Tramontana, ai così detti Mulini, ed alle Case Vecchie, presso il paese.
5. *Agrotis segetum*, Schiff.—Raccolsi alcuni esemplari alla Falconiera, dove la specie mostrasi con una certa frequenza.
6. *Leucania pumosa*, Tr.—La trovi frequente, in varii punti dell'isola, specialmente in contrada Tramontana, dove ne raccolsi alquanti esemplari.
7. *Plusia gamma*, Lin.—Mediocrementemente frequente, in particolare alla Falconiera ed in contrada Tramontana.
8. *Agrophila trabealis*, Scop.—Frequentissima. Ne raccolsi numerosi esemplari in contrada Tramontana nella casa di mia abitazio-

32. *Poeciloscytus cognatus*, Fieb.—Alcuni indiv. in contr. Tramontana.
33. *Campptobrochis punctulata*, Fall.—Comune soprattutto sulle Crucifere: Tramontana, Guardia del Turco ecc.
34. *Tettigia orni*, Lin.—Riferisco a questa specie una larva raccolta in mezzo alla terra alla Guardia del Turco, presso la Grotta del Rapillo; e le spoglie secche di due ninfe, trovate alle Case vecchie.
35. *Thamnotettix fenestratus*, H.S.—Mediocrom. frequente. Ne raccolsi qualche indiv. in contrada Tramontana.

NEUROTTERI

? Chry. per h. oppure? Chry. arnes?

1. *Emerobius perla*, Lin.—Non raro. Ne presi alcuni individui alla Falconiera ed alla Guardia del turco, alla così detta Costa di Fadda; ne osservai anche altrove.
2. *Mirmeleo* sp.—Un solo esemplare.

PSEUDONEUROTTERI

1. *Calotermes flavicollis*, Fabr.—Mediocrementemente frequente. Ne raccolsi alla Falconiera ed a Tramontana; in quest'ultima località trovai anche le larve, sotto gli articoli semimarciti di Fichidindia.
2. *Anas formosus*, V. d. L.—S'incontra frequentemente nell'isola questa grande e bella specie di *Libellula*; spesseggia soprattutto al gorgo presso l'Ogliastrello, dove con qualche stento, potei raccogliere due esemplari ♂ e ♀.
3. *Libellula sanguinea*, Müll.—Incontrasi di tanto in tanto per l'isola. Ne raccolsi alcuni individui alla Guardia di mezzo, a Tramontana ed all'Ogliastrello.

ORTOTTERI

1. *Anisolabis annulipes*, Luc.—Trovi questa specie molto comune, particolarmente in contr. Tramontana nei letamai; ne raccolsi qualche esemplare anche altrove. Rinvenni indiv. di tutte le età, come pure nidi con uova e larve piccolissime; delle quali potei seguire lo sviluppo. Nel 1885 raccolsi una *Anisolabis* che per essere un poco guasta e mancante di antenne riferii erro-