

***Semidalis pseudouncinata* Meinander, 1963**



maschio foto [www.boldsystem.org](http://www.boldsystem.org)

Specie legata a Cupressacee come i cipressi, *Thuja*, *Juniperus* ecc.; raccolta dal livello del mare sino i 1400 m. (Aspöck et al, 1980). È presente in natura allo stato adulto in Europa da maggio ad agosto. Due o tre generazioni annue.

**Stadi preimmaginali:** Lauterbach, 1972.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 2,5 a 3 mm. (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Piemonte; Lombardia?; Trentino Alto Adige?; Veneto?; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Marche; Lazio; Basilicata; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna (anche isola Asinara).

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Navás, 1928b; Aspöck et al., 1964a ?, 1969, 1980; Pantaleoni, 1982, 1986b, 1988, 1990a, 1994a; Monserrat, 1984; De Marzo et al., 1992; Divietri, 1993; Duelli, 1994; Bernardi Iori et al., 1995; Dessart, 1995; Lo Verde et al., 1997; Molinu et al., 2007; Cesaroni, 2007; Badano, 2008c; Badano & Letardi, 2010;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).