

***Wesmaelius malladai* (Navás, 1925)**



Adulto foto Lorenzo Rapa 2015

Specie d'alta quota (sino i 2300 m.), trovata su latifoglie e conifere, ma anche su specie arbustive come il mirtillo (Aspöck et al., 1980).

**Stadi preimmaginali:** sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 8 a 10,5 mm.; gli adulti si trovano in natura tra maggio e ottobre (Aspöck et al., 1980).

**Distribuzione regionale italiana:**

Valle d'Aosta; Piemonte; Lombardia; Trentino Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia.

**Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:**

Aspöck , 1963c; Nielsen , 1976(?); Monserrat, 1980; Aspöck et al., 1969, 1980; Cocquemot et al., 1990; Leraut, 1992c; Nicoli Aldini, 1994; Hellrigl et al., 1996; Pantaleoni & Letardi, 1998; Monserrat, 2004; AAVV, 2016a; Letardi, 2022;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/).