

***Wesmaelius tjederi* (Kimmins, 1963)**



Adulto di *Wesmaelius sp.* da www.flickr.com

Specie dall'ecologia praticamente sconosciuta, raccolta prevalentemente con trappole luminose in ambienti boscati (latifoglie e conifere) del piano subalpino (Aspöck et al., 1980).

Stadi preimmaginali: sconosciuti.

Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 7 a 9,5 mm.; gli adulti si trovano in natura tra giugno e settembre (Aspöck et al., 1980).

Distribuzione regionale italiana:

Piemonte; Lombardia; Trentino Alto Adige; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Abruzzo; Sicilia.

Pubblicazioni che citano questa specie in Italia:

Kimmins, 1963; Aspöck et al., 1964a, 1969, 1980; Ohm, 1967; Bernardi Iori et al., 1995; Letardi & Pantaleoni, 1996; Longo et al., 2001; Monserrat, 2004; Nicoli Aldini, 2005b;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/).